

İMLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLERDE BAR VE LOCATOR ATAŞMAN SİSTEMLERİ: VAKA RAPORU

Elçin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Ceren Küçük, Buket Evren,
Yasemin Özkan

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD.,
İstanbul, Türkiye.

Tam dişsiz hastaların protetik rehabilitasyonunda sıklıkla total protezler kullanılmaktadır. Total protezler kemik rezorbsiyonunun fazla olduğu hastalarda, retansiyon ve stabilite eksikliği gibi sorunlar nedeniyle implant sistemleri ile desteklenebilmektedir. Bu vaka raporunda, tam dişsiz hastaya maksillada 4; mandibulada 2 implant ile iki farklı tutucu sistemi kullanılarak yapılan protetik diş tedavisinin sunulması amaçlanmıştır.

Eski protezlerinin tutuculuğundan şikayetçi olan 51 yaşındaki erkek tam dişsiz hasta, implant destekli total protez yaptırmak için Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'na başvurdu. Yapılan radyografik ve klinik incelemelerde implant cerrahisi için herhangi bir engel bulunmamasıyla birlikte dişsiz kretler arası mesafenin rezorbsiyon sonucu arttığı gözlemlendi. Hastamıza üst çenede simetrik olarak lateral ve birinci premolar bölgesine 4 adet implant (GMI Frontier İmplant, İlerimplant SL, İspanya); alt çenede simetrik olarak kanin bölgesine 2 implant (GMI Frontier İmplant, İlerimplant SL, İspanya) uygulandı. Üst çenede bar tutuculu sistem (Dolder Bar, Strauman, ITI, İsviçre); alt çenede ise locator sistem (GMI Frontier İmplant, İlerimplant SL, İspanya) kullanılarak tedavisi tamamlandı.

Protezin tesliminden sonra yapılan erken dönem kontrollerinde hasta memnuniyetinin yüksek olduğu gözlemlendi. Yapılan kontrollerde protez- doku ve protez-implant ara bağlantı uyumlarının iyi olduğu görüldü.

İmplant destekli overdenture uygulamasının estetik, fonksiyon, fonasyon özellikleri yüksek bir tedavi sağlar. İmplant destekli protezler total protezlere göre daha stabil ve retantif bir protetik tedavi seçeneğidir.

